

商品紹介

“みみっこ[®]” 商品形態



● みみっこ20
内容量 20L



● みみっこ10
内容量 10L



(特注品)
●みみっこ2
内容量 2L

“みみっこ” 使用方法

水田稲作

時期	使用量	希釈率	使用方法
育苗時	200 cc	約 500 倍	ビニールカバーを剥した後 3日おきに 2~3 回散布
定植時	10ℓ	原液	10~15 日以内に、 水の取入れ口に注ぐ
定植後	10ℓ	原液	妖穂形成期に 水の取り入れ口に注ぐ

花木栽培

時期	使用量	希釈率	使用方法
土作り	15ℓ	約 100~ 200 倍	堆肥すき込み時に 土壌散布
育苗	200 cc	約 500 倍	期間中 2~3 回 育苗ケースに散布
定植後	500 cc ×6=3ℓ	約 1000 倍	月 2~3 回程度 葉面散布

露地栽培

時期	使用量	希釈率	使用方法
土作り	20ℓ	約 100~ 200 倍	堆肥に直接散布
育苗	200 cc	約 500 倍	期間中 2~3 回 育苗ケースに散布
定植後	0.5×6 =3ℓ	約 500 倍	月 1~2 回程度、 葉面散布

果樹栽培

時期	使用量	希釈率	使用方法
土作り	10ℓ	約 100 倍	11 月~3 月 堆肥すき込み時 土壌散布
	7ℓ	約 100 倍	4 月~7 月 圃場全体に散布
育成	1ℓ×3 =3ℓ	約 500 倍	月 1 回程度、圃場全体に 葉面散布

ハウス栽培

<10a(1 反)あたり>

時期	使用量	希釈率	使用方法
土作り	15ℓ	約 300 ~500 倍	堆肥すき込み時又は 定植 2~3 週間前に土壌散 布
育苗	200cc	約 500 倍	期間中 1 週間おきに 3 回 ポットに散布
定植後	0.5×3 =1.5ℓ	約 500 倍	3 日おきに灌水で適宜散布
	0.5×6 =3ℓ	約 1000 倍	月 1~2 回程度 葉面散布

○土作り時—・残留農薬分解・土壌、根張り強化

・微生物、生成物供給

○育苗時——・樹勢、根張り強化

○定植後——・樹勢、抵抗力強化・活着促進

など様々効果が期待できます。

※使用量、回数、希釈率は一般参考値です。※殺菌剤・殺虫剤・石灰チツソの併用は避けて下さい。完熟堆肥・有機液肥の併用でより効果を発揮します。